

ワクチン接種・抗体価調査について

(1) 麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘

ワクチン接種歴を確認し、下記の対応をお願いします。

接種歴	対応
2回接種済	不要
1回接種済	原則、追加で「1回」ワクチンを接種する。もしくは、血液検査による抗体価測定を行い、検査結果が下記の〈ワクチン接種基準〉に該当する場合は、「1回」ワクチンを接種する。
接種歴なし又は不明	原則「2回」ワクチンを接種する。もしくは、血液検査による抗体価測定を行い、検査結果が下記の〈ワクチン接種基準〉に該当する場合は、「2回」ワクチンを接種する。

<ワクチン接種基準>

感染症	ワクチン接種の対象となる抗体価
麻疹	EIA 価：IgG 16.0 未満
風疹	EIA 価：IgG 8.0 未満（HIの場合：32倍未満）
流行性耳下腺炎・水痘	EIA 価：IgG 4.0 未満

(2) B型肝炎(HB)

血液検査による抗体価測定を行い、下記の対応をお願いします。

抗体価	対応
10mIU/mL 以上	不要
10mIU/mL 未満	「1クール（3回）」 ワクチンを接種する。

- ※1 1 クール（3回）のワクチン接種後、血液検査による抗体価測定を行い、その結果が 10mIU/mL 未満の場合は追加で 1 クール（3回）接種することが望ましい。
- ※2 過去に 1 回でも 10mIU/mL 以上抗体保有した場合は、抗体有として対応。
- ※3 既感染者の抗体価測定・ワクチン接種は不要。
- ※4 事務職の抗体価測定・ワクチン接種は必須ではない。

(3) インフルエンザ

当院では、医療従事者にワクチン接種を強く推奨しています。実習生等にも同様、接種を推奨します。なお、インフルエンザワクチン接種の推奨は、12月から 3月までに実習等がある場合に限ります。

※上記（1）～（3）のワクチン接種は、研修の 4 週間前までに接種してください。