

# 外来化学療法 投与計画書

# 腫瘍内科 PAC療法(食道癌)

29-077

パクリタキセル(壊死性) 100mg/m<sup>2</sup>

|       |                                  |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |
|-------|----------------------------------|------------|---------|----------------|------|------|---------|--------|--------|-------|-------|
| ID    | :                                | 身長         | :       | cm             |      |      |         |        |        |       |       |
| フリガナ  | :                                | 体重         | :       | kg             |      |      |         |        |        |       |       |
| 患者氏名  | :                                | 体表面积       | :       | m <sup>2</sup> |      |      |         |        |        |       |       |
|       |                                  | クレアチニン     | :       | mg/dL          |      |      |         |        |        |       |       |
| 生年月日  | :                                | S・H・R      | 年       | 月              | 日    | 生まれ  |         |        |        |       |       |
| 治療計画  | 外来初回治療日                          | 年          | 月       | 日より            | コース目 | day  | 開始      | 予定コース数 | 評価コース数 |       |       |
| 外来担当医 | PHS                              | 記載医師       | :       | PHS            |      |      | 薬剤師1次監査 | 年      | 月      | 日     |       |
| Rp    | 投与スケジュール:1コース49日間                |            |         |                | day1 | day8 | day15   | day22  | day29  | day36 | day43 |
| 1本目   | インラインフィルターのついたルートを使用             |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |
|       | 末梢主管点滴注射                         | デカドロン(6.6) | 6.6mg   |                | ●    | ●    | ●       | ●      | ●      | ●     | ×     |
|       |                                  | ファモチジン(20) | 20mg    |                |      |      |         |        |        |       |       |
|       |                                  | ポララミン(5)   | 5mg     |                |      |      |         |        |        |       |       |
|       | 生食 50mL                          |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |
| 投与時間  | 30分                              |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |
| 2本目   | 末梢主管点滴注射                         | パクリタキセル    | _____mg |                | ●    | ●    | ●       | ●      | ●      | ●     | ×     |
|       | 生食 250mL                         |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |
| 投与時間  | 60分                              |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |
|       | ( _____年 _____月 _____日 %doseへ減量) |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |
| 3本目   | 末梢主管点滴注射                         |            |         |                | ●    | ●    | ●       | ●      | ●      | ●     | ×     |
|       | 生食 100mL                         |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |
| 投与時間  | 全開                               |            |         |                |      |      |         |        |        |       |       |

## 1. その他連絡事項