

外来化学療法 投与計画書

腫瘍内科 ニボルマブ+イピリムマブ療法 (MSI-High大腸癌)

29-518A

ID	:	身長	:	cm	ヤーボイ(起炎症性) 1mg/kg
フリガナ	:	体重	:	kg	オプジーボ(起炎症性) 240mg/body
患者氏名	:	体表面積	:	m ²	
		クレアチニン	:	mg/dL	
生年月日	:	S・H・R	年	月	日
治療計画	外来初回治療日	年	月	日	より
	コース目	day	開始	予定コース数	評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS	Ⓢ	薬剤師 2次監査
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間	day1	day8	day15
	インラインフィルターのついたルートを使用				
1本目	末梢主管点滴注射		●	×	×
	オプジーボ__240mg				
投与時間	生食 100mL				
	30分				
	(年 月 日 %doseへ減量)				
2本目	末梢主管点滴注射		●	×	×
	生食 50mL				
投与時間	30分				
3本目	末梢主管点滴注射		●	×	×
	ヤーボイ_____mg				
投与時間	生食 20mL				
	30分				
	(年 月 日 %doseへ減量)				
4本目	末梢主管点滴注射		●	×	×
	生食 50mL				
投与時間	全開				

1. その他連絡事項

併用は4コースで終了、以降は維持療法としてニボルマブ単独療法