

# 外来化学療法 投与計画書

## 腫瘍内科 ペルツズマブ+トラスツズマブ療法【大腸癌】(初回、維持)

ID	身長	cm	29-521A、521B			
フリガナ	体重	kg	ハーセプチン(起炎症性)初回 8mg/kg			
患者氏名	体表面積	m <sup>2</sup>	ハーセプチン(起炎症性)2回目以降 6mg/kg			
	クレアチニン	mg/dL	パージエタ(起炎症性)初回 840mg/body			
生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ			パージエタ(起炎症性)2回目以降 420mg/body			
治療計画	外来初回治療日 年 月 日より	コース目 day	開始	予定コース数	薬剤師1次監査 年 月 日	
				評価コース数		
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS	薬剤師 2次監査		
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間			day1	day8	day15
1本目	末梢主管点滴注射 パージエタ840mg 生食 250mL 投与時間 ( 年 月 日 初回 60分 %doseへ減量)			●	×	×
						初回と維持(2回目以降)で用量投与時間が異なるため注意して投与してください。 29-521A初回840mg/body 60分 29-521B維持420mg/body 30分
1本目	末梢主管点滴注射 パージエタ420mg 生食 250mL 投与時間 ( 年 月 日 2回目以降 30分 %doseへ減量)			●	×	×
2本目	末梢主管点滴注射 ハーセプチン _____ mg 生食 250mL 投与時間 ( 年 月 日 初回 90分 %doseへ減量)			●	×	×
						初回と維持(2回目以降)で用量投与時間が異なるため注意して投与してください。 29-521A初回8mg/kg 90分 29-521B維持6mg/kg 30分
2本目	末梢主管点滴注射 ハーセプチン _____ mg 生食 250mL 投与時間 ( 年 月 日 2回目以降 30分 %doseへ減量)			●	×	×
3本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開			●	×	×

### 1. その他連絡事項

- \* 薬剤師が監査後【初回、維持】のハーセプチン、パージエタRpは必要な方を残し、残りは非表示にしてください。
- \* カロナール200mg錠 1回2錠をハーセプチン投与30分前に使用 2回目以降は適宜使用