

外来化学療法 投与計画書

G-CapeOX+トラスツズマブ療法

腫瘍内科 維持6mg

29-602B

| | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|------|----------------|--|----------|-------|
| ID | : | 身長 | : | cm | オキサリプラチン(炎症性) 130mg/m ² ゼローダ(内服) トラスツズマブ(起炎症性)(維持) 6mg/kg | | |
| フリガナ | : | 体重 | : | kg | | | |
| 患者氏名 | : | 体表面積 | : | m ² | | | |
| | | クレアチニン | : | mg/dL | | | |
| 生年月日 | : | S・H・R | 年 | 月 | 日 | 生まれ | |
| 治療計画 | 外来初回治療日 | 年 | 月 | 日 | より | コース目day | |
| | | | | | | 開始 | |
| | | | | | | 予定コース数 | |
| | | | | | | 評価コース数 | |
| 外来担当医: | | PHS | 記載医師 | | PHS | | |
| | | | | | | 薬剤師 2次監査 | |
| Rp | | 投与スケジュール: 1コース21日間 | | | day1 | day8 | day15 |
| 1本目 | 末梢主管点滴注射 | トラスツズマブBS _____ mg | | | ● | × | × |
| 投与時間 | 生食 250mL | 60分 | | | | | |
| | (_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ %doseへ減量) | | | | | | |
| 2本目 | 末梢主管点滴注射 | アロキシ(0.75) 0.75mg | | | ● | × | × |
| 投与時間 | デカドロン(6.6) 6.6mg | 生食 100mL | | | | | |
| | | 30分 | | | | | |
| 3本目 | 末梢主管点滴注射 | オキサリプラチン _____ mg | | | ● | × | × |
| 投与時間 | 5%ブドウ糖液 250mL | 2時間 | | | | | |
| | (_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ %doseへ減量) | | | | | | |
| 4本目 | 末梢主管点滴注射 | 5%ブドウ糖液 50mL | | | ● | × | × |
| 投与時間 | | 全開 | | | | | |
| 内服処方 | ゼローダ _____ mg | 14日間 | | | day1夕~day15朝 | | × |
| | 1日2回 朝夕食後 | | | | | | |
| | ゼローダの内服 | day1夕食後からday15朝食後まで | | | | | |
| | (体表面積) | | | | | | |
| | 1.36m ² 未満: | : 2400mg/body/day | | | | | |
| | 1.36m ² 以上1.66m ² 未満: | : 3000mg/body/day | | | | | |
| | 1.66m ² 以上1.96m ² 未満: | : 3600mg/body/day | | | | | |
| | 1.96m ² 以上 | : 4200mg/body/day | | | | | |

1. その他連絡事項

2020年10月ハーセプチン→トラスツズマブBSに変更
2017年3月 エルプラット→オキサリプラチンへ変更
2017年1月19日作成