

外来化学療法
投与計画書

腫瘍内科
G-SOX【100】+トラスツズマブ+ペムブロリズマブ療法(初回・維持)

ID		身長		cm		29-621B、29-621D	
フリガナ		体重		kg		オキサリプラチン 100mg/m ²	
患者氏名		体表面積		m ²		S-1(内服)	
		クレアチニン		mg/dL		トラスツズマブ(初回) 8mg/kg	
生年月日		S・H・R		年 月 日生まれ		トラスツズマブ(維持) 6mg/kg	
						キイトルーダ 200mg/body	
治療計画		外来初回治療日		予定コース数		薬剤師1次監査	
		年 月 日より		コース目day 開始		年 月 日	
外来担当医		PHS		記載医師		PHS	
						薬剤師 2次監査	
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		day1		day8	
				day15			
1本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		インラインフィルターのついたルートを使用					
		キイトルーダ 200 mg					
投与時間		生食 100mL					
		30分					
		(年 月 日 %doseへ減量)					
2本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食 50mL					
投与時間		全開					
3本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		トラスツズマブBS mg					
投与時間		生食 250mL					
		初回 90分					
		(年 月 日 %doseへ減量)					
3本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		トラスツズマブBS mg					
投与時間		生食 250mL					
		2回目以降 30分					
		(年 月 日 %doseへ減量)					
4本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食 50mL					
投与時間		全開					
5本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		パロノセトロン(0.75)		0.75mg			
		デカドロン(6.6)		6.6mg			
		アロカリス(235)		235mg			
投与時間		生食 100mL					
		30分					
6本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		オキサリプラチン mg					
投与時間		5%ブドウ糖液 250mL					
		2時間					
		(年 月 日 %doseへ減量)					
7本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		5%ブドウ糖液 50mL					
投与時間		全開					
内服処方		エスワン mg					
		1日2回 朝夕食後		14日間		day1夕～day15朝	
						×	
		S-1の内服					
		day1夕食後からday15朝食後まで					
		(体表面積)					
		1.25m ² 未満:		:80mg/body/day			
		1.25m ² 以上1.5m ² 未満:		:100mg/body/day			
		1.5m ² 以上		:120mg/body/day			

1. その他連絡事項
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
☒ 依頼する ☐ 依頼しない

外来化学療法
投与計画書

腫瘍内科
G-SOX【100】+トラスツズマブ+ペムブロリズマブ療法(初回・維持)