

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 CBDCA+ペメトレキセド療法

59-002

ペメトレキセド 500mg/m²
カルボプラチン AUC=6

ID	:	身長	:	cm						
フリガナ	:	体重	:	kg						
患者氏名	:	体表面积	:	m ²						
	:	クレアチニン	:	mg/dL						
生年月日	:	S・H・R	年	月	日	生まれ				
治療計画	外来初回治療日	年	月	日	より	コース目	day	開始	予定コース数	評価コース数
	外来担当医:	PHS	記載医師	PHS	⑩	薬剤師 2次監査	⑩			
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間			day1	day8	day15			
1本目	末梢主管点滴注射	パロノセトロン(0.75)	0.75mg		●	×	×			
		デカドロン(6.6)	13.2mg							
		生食 100mL								
投与時間			20分							
2本目	末梢主管点滴注射	ペメトレキセド _____mg			●	×	×			
		生食 100mL								
投与時間			10分							
		(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)								
3本目	末梢主管点滴注射	生食 100mL			●	×	×			
投与時間			30分							
4本目	末梢主管点滴注射	カルボプラチン _____mg			●	×	×			
		5%ブドウ糖液 250mL								
投与時間			60分							
		(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)								
5本目	末梢主管点滴注射	生食 50mL			●	×	×			
投与時間			全開							

1. その他連絡事項

【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

*ビタミンB12 1mg【ex:メチコバル®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

依頼する

依頼しない

2024年2月 指導依頼の文言追加
2024年2月 グラニセトロン→パロノセトロンへ変更
2022年06月 アリムタ→ペメトレキセドへ変更
2019年3月11日 作成