

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 CBDCA+PAC(同時放射線治療)療法

59-011

パクリタキセル(壊死性) 40mg/m²
カルボプラチン(炎症性) AUC=2

ID	:	身長	:	cm					
フリガナ	:	体重	:	kg					
患者氏名	:	体表面积	:	m ²					
		クレアチニン	:	mg/dL					
生年月日	:	S・H・R		年	月	日	生まれ		
治療計画	外来初回治療日	年	月	日より	コース目	day	開始	予定コース数 評価コース数	
外来担当医:	PHS	記載医師	:	PHS					
Rp		投与スケジュール:	1コース42日間	day1	day8	day15	day22	day29	day36
インラインフィルターつきのルートを使用									
内服	2本目開始30分以上前にレスタミンコーワ錠5錠内服			●	●	●	●	●	●
1本目	末梢主管点滴注射 グラニセトロン3mg/バック(100mL) 1袋 デカドロン(6. 6) 13. 2mg デカドロン(1. 65) 3. 3mg ファモチジン(20) 20mg 投与時間 30分			●	●	●	●	●	●
2本目	末梢主管点滴注射 パクリタキセル _____ mg 生食 250mL 投与時間 1時間 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 %doseへ減量)			●	●	●	●	●	●
3本目	末梢主管点滴注射 カルボプラチン _____ mg 5%ブドウ糖液 250mL 投与時間 1時間 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 %doseへ減量)			●	●	●	●	●	●
4本目	末梢主管点滴注射 生食 100mL 投与時間 全開			●	●	●	●	●	●

1. その他連絡事項

* 初回レスタミンコーワ錠1回5錠処方確認(有・無)

2020年10月 ラニチジン→ファモチジンへ変更
2020年10月 アザセトロン→グラニセトロンへ変更
2017年3月 セロトニン→アザセトロンへ変更
2016年11月 レイアウト変更
2016年7月 ザンタック→ラニチジンへ変更
2013年2月 作成