

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 CDDP+GEM療法(悪性中皮腫)

59-092

ゲムシタビン(炎症性) 1000mg/m²
シスプラチン(炎症性) 80mg/m²

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|---------|----------------|--------|--------|
| ID | : | 身長 | : | cm | | |
| フリガナ | : | 体重 | : | kg | | |
| 患者氏名 | : | 体表面積 | : | m ² | | |
| | | クレアチニン | : | mg/dL | | |
| 生年月日 | M・T・S 年 月 日 生まれ | | | | | |
| 治療計画 | 外来初回治療日 | 平成 年 月 日 日より | コース目day | 開始 | 予定コース数 | 評価コース数 |
| 外来担当医: | PHS | 記載医師 | PHS | 薬剤師1次監査 | | 年月日 |
| Rp | 投与スケジュール: 1コース21日間 | | | day1 | day8 | day15 |
| 内服 | 入室時イメンド125mg 1カプセル服用 | | | ● | × | × |
| | day2以降 イメンド80mg 1カプセル朝食後 2日分 デカドロン(0.5) 1日8mg 食後 2日分 | | | day2-3 | × | × |
| | | | | day2-3 | × | × |
| 1本目 | 末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL アスパラカリウム注 10mL 生食 500mL | | | ● | × | × |
| 投与時間 | 1時間 | | | | | |
| 2本目 | 末梢主管点滴注射 生食 500mL | | | ● | × | × |
| 投与時間 | 末梢側管点滴注射 アロキシン(0.75) 0.75mg デカドロン(6.6) 6.6mg デカドロン(1.65) 3.3mg 生食 100mL 30分 | | | | | |
| 3本目 | 末梢側管点滴注射 | | | ● | × | × |
| 投与時間 | ゲムシタビン _____ mg 生食 100mL 30分 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 %doseへ減量) | | | | | |
| 4本目 | 末梢主管点滴注射 フロセミド注(20) 20mg 生食 50mL | | | ● | × | × |
| 投与時間 | 全開 | | | | | |
| 5本目 | 末梢主管点滴注射 | | | ● | × | × |
| 投与時間 | シスプラチン _____ mg 生食 250mL 2時間 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 %doseへ減量) | | | | | |
| 6本目 | 末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL アスパラカリウム注 10mL 生食 500mL | | | ● | × | × |
| 投与時間 | 1時間 | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|---|
| 1本目 | 末梢主管点滴注射 デカドロン(6.6) 6.6mg 生食 100mL | | | × | ● | × |
| 投与時間 | 30分 | | | | | |
| 2本目 | 末梢主管点滴注射 | | | × | ● | × |
| 投与時間 | ゲムシタビン _____ mg 生食 100mL 30分 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 %doseへ減量) | | | | | |
| 3本目 | 末梢主管点滴注射 生食 100mL | | | × | ● | × |
| 投与時間 | 全開 | | | | | |

1. その他連絡事項

2016年11月 レイアウト変更
2016年4月 ショートハイトレーションへ変更
2016年3月 ジェムザール→ゲムシタビンへ変更
2013年2月 レジメン番号変更
2010年3月16日作成