

外来化学療法 投与計画書

次ページあります

呼吸器内科 ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PAC療法

59-152AB

オプジーボ(起炎症性) 360mg/body
ヤーボイ(起炎症性) 1mg/kg
パクリタキセル(壊死性) 200mg/m²
カルボプラチン(炎症性) AUC=6

ID	:	身長	:	cm				
フリガナ	:	体重	:	kg				
患者氏名	:	体表面積	:	m ²				
		クレアチニン	:	mg/dL				
生年月日	:	S・H・R	年	月	日	生まれ		
治療計画	外来初回治療日	年	月	日より	コース目	day	開始	予定コース数
								評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	:	PHS	Ⓢ	薬剤師 2次監査	Ⓢ	年 月 日
Rp		投与スケジュール:1コース42日間	day1	day8	day15	day22	day29	day36
1本目	インラインフィルターのついたルートを使用							
	末梢主管点滴注射			●	×	×	×	×
	オプジーボ__360mg							
	生食 100mL							
投与時間	30分							
	(年 月 日 %doseへ減量)							
2本目	末梢主管点滴注射			●	×	×	×	×
	生食 50mL							
投与時間	30分							
3本目	末梢主管点滴注射			●	×	×	×	×
	ヤーボイ_____mg							
	生食 20mL							
投与時間	30分							
	(年 月 日 %doseへ減量)							
4本目	末梢主管点滴注射			●	×	×	×	×
	生食 50mL							
投与時間	30分							
5本目	末梢主管点滴注射			●	×	×	×	×
	デカドロン(6.6)							
	13.2mg							
	ファモチジン(20)							
	20mg							
	アロキシ(0.75)							
	0.75mg							
	ポララミン(5)							
	5mg							
	生食 100mL							
投与時間	30分							
6本目	末梢主管点滴注射			●	×	×	×	×
	パクリタキセル_____mg							
	生食テルモ 500mL							
投与時間	180分							
	(年 月 日 %doseへ減量)							
7本目	末梢主管点滴注射			●	×	×	×	×
	カルボプラチン_____mg							
	5%ブドウ糖液 250mL							
投与時間	60分							
	(年 月 日 %doseへ減量)							
8本目	末梢主管点滴注射			●	×	×	×	×
	生食 50mL							
投与時間	全開							

1. その他連絡事項

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PAC療法

59-152AB

オブジーボ(起炎症性) 360mg/body

パクリタキセル(壊死性) 200mg/m²

カルボプラチン(炎症性) AUC=6

ID	:	身長	:	cm					
フリガナ	:	体重	:	kg					
患者氏名	:	体表面積	:	m ²					
	:	クレアチニン	:	mg/dL					
生年月日	:	S・H・R	年	月	日	生まれ			
治療計画	外来初回治療日	年	月	日より	コース目	day	開始	予定コース数	
								評価コース数	
外来担当医	PHS	記載医師	PHS			薬剤師1次監査	年	月	日
						Ⓔ	薬剤師	2次監査	Ⓔ
Rp		投与スケジュール:1コース42日間	day1	day8	day15	day22	day29	day36	
1本目	インラインフィルターのついたルートを使用								
	末梢主管点滴注射			×	×	×	●	×	
	オブジーボ__360mg								
	生食 100mL								
投与時間	30分								
	(年 月 日 %doseへ減量)								
2本目	末梢主管点滴注射			×	×	×	●	×	
	生食 50mL								
投与時間	30分								
3本目	末梢主管点滴注射			×	×	×	●	×	
	デカドロン(6.6)								
	13.2mg								
	ファモチジン(20)								
	20mg								
	アロキシ(0.75)								
	0.75mg								
	ポララミン(5)								
	5mg								
投与時間	生食 100mL								
	30分								
4本目	末梢主管点滴注射			×	×	×	●	×	
	パクリタキセル_____mg								
	生食テルモ 500mL								
投与時間	180分								
	(年 月 日 %doseへ減量)								
5本目	末梢主管点滴注射			×	×	×	●	×	
	カルボプラチン_____mg								
	5%ブドウ糖液 250mL								
投与時間	60分								
	(年 月 日 %doseへ減量)								
6本目	末梢主管点滴注射			×	×	×	●	×	
	生食 50mL								
投与時間	全開								

1. その他連絡事項