

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 ヘムブロリズマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法

59-204

キイトルーダ 200mg/body
ペメトレキセド 500mg/m²
カルボプラチン AUC=5

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|
| ID | : | 身長 | : | cm |
| フリガナ | : | 体重 | : | kg |
| 患者氏名 | : | 体表面積 | : | m ² |
| | : | クレアチニン | : | mg/dL |
| 生年月日 | : | T・S・H | 年 月 日 | 生まれ |
| 治療計画 | 外来初回治療日 | 年 月 日 | より | コース目day 開始 |
| | | | | 予定コース数 評価コース数 |
| 外来担当医: | PHS | 記載医師 | PHS | 薬剤師1次監査 年 月 日 |
| Rp | | 投与スケジュール: 1コース21日間 | day1 | day8 |
| | | インラインフィルター(0.2~5μm) 付きのルートを使用 | | |
| | | * イメンド125mg: ペメトレキセド開始1時間から1時間半前に服用 | | |
| 1本目 | 末梢主管点滴注射 | ● | × | × |
| | キイトルーダ 200mg 生食 100mL | | | |
| 投与時間 | 30分 (年 月 日 %doseへ減量) | | | |
| 2本目 | 末梢主管点滴注射 | ● | × | × |
| | 生食 50mL | | | |
| 投与時間 | 全開 | | | |
| 3本目 | 末梢主管点滴注射 | ● | × | × |
| | パロノセトロン(0.75) デカドロン(6.6) 生食 100mL | | | |
| 投与時間 | 0.75mg 6.6mg 20分 | | | |
| 4本目 | 末梢主管点滴注射 | ● | × | × |
| | ペメトレキセド _____mg 生食 100mL | | | |
| 投与時間 | 10分 (年 月 日 %doseへ減量) | | | |
| 5本目 | 末梢主管点滴注射 | ● | × | × |
| | 生食 100mL | | | |
| 投与時間 | 30分 | | | |
| 6本目 | 末梢主管点滴注射 | ● | × | × |
| | カルボプラチン _____mg 5%ブドウ糖液 250mL | | | |
| 投与時間 | 60分 (年 月 日 %doseへ減量) | | | |
| 7本目 | 末梢主管点滴注射 | ● | × | × |
| | 生食 50mL | | | |
| 投与時間 | 全開 | | | |

1. その他連絡事項

【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

*ビタミンB12 1mg【ex:メチコパール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

依頼する

依頼しない

2024年2月グラニセトロン→パロノセトロンへ変更
2024年2月指導依頼の文言追加
2022年06月アリムタ→ペメトレキセドへ変更
2019年3月11日作成

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科
ヘムブロリスマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法

2024年2月グラニセトロン→パロノセトロンへ変更
2024年2月指導依頼の文言追加
2022年06月アリムタ→ペメトレキセドへ変更
2019年3月11日作成