

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 ペムブロリスマブ+ペメトレキセド維持療法

59-205

ID	:	身長	:	cm	キイトルーダ(起炎症性) 200mg/body ペメトレキセド(起炎症性) 500mg/m ²	
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面積	:	m ²		
	:	クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日	: S・H 年 月 日 生まれ				薬剤師1次監査	
治療計画	外来初回治療日	年 月 日より	コース目 day	開始	予定コース数	
					評価コース数	
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS		① 薬剤師 ② 2次監査	
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間			day1	day8	day15
1本目	末梢主管点滴注射 キイトルーダ 200mg 生食 100mL 投与時間 30分 (年 月 日 %doseへ減量)			●	×	×
2本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開			●	×	×
3本目	末梢主管点滴注射 デカドロン(6.6) 生食 100mL 投与時間 20分			●	×	×
4本目	末梢主管点滴注射 ペメトレキセド _____mg 生食 100mL 投与時間 10分 (年 月 日 %doseへ減量)			●	×	×
5本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開			●	×	×

1. その他連絡事項

【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

*ビタミンB12 1mg【ex:メチコバル®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、
投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。