

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 へムブロリス`マブ+CBDCA+nab-PAC療法

59-206

ID	:	身長	:	cm	キイトルーダ(起炎症性) 200mg/body CBDCA(炎症性) AUC=6 アブラキサン(壊死性) 100mg/m ²		
フリガナ	:	体重	:	kg			
患者氏名	:	体表面積	:	m ²			
	:	クレアチニン	:	mg/dL			
生年月日	:	S・H	:	年 月 日生まれ			
治療計画	外来初回治療日	年 月 日より	コース目	day 開始	予定コース数 評価コース数		
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS		薬剤師 2次監査		
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間				day1	day8	day15
内服	入室時イメンド125mg 1カプセル服用				●	×	×
	day2以降 イメンド80mg 1カプセル朝食後 2日分				day2-3	×	×
	インラインフィルター (0.2~5μm)つきのルートを使用						
1本目	末梢主管点滴注射 キイトルーダ 200mg 生食 100mL 投与時間 30分 (年 月 日 %doseへ減量)				●	×	×
2本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開				●	×	×
	インラインフィルターつきの ルート不可						
3本目	末梢側管点滴注射 アロキソ(0.75) 0.75mg デカドロン(6.6) 6.6mg 生食 100mL 投与時間 30分				●	×	×
4本目	末梢側管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開				●	×	×
5本目	末梢側管点滴注射 アブラキサン _____ mg 生食 _____ mg(5mg/mLへ調製) 投与時間 30分 (年 月 日 %doseへ減量)				●	×	×
6本目	末梢側管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開				●	×	×
7本目	末梢側管点滴注射 カルボプラチン _____ mg 5%ブドウ糖 250mL 投与時間 1時間 (年 月 日 %doseへ減量)				●	×	×
8本目	末梢側管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開				●	×	×

	インラインフィルターつきのルート不可						
1本目	末梢主管点滴注射 デカドロン(6.6) 6.6mg 生食 100mL 投与時間 30分				×	●	●
2本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開				×	●	●
3本目	末梢主管点滴注射 アブラキサン _____ mg 生食 _____ mL(5mg/mLへ調製) 投与時間 30分 (年 月 日 %doseへ減量)				×	●	●
4本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開				×	●	●

1. その他連絡事項