

# 外来化学療法 投与計画書

# 呼吸器内科 【80kg未満】アミバンタマブ+ラゼルチニブ療法【1コース目】

※2枚目あります

59-220A

ID	:	身長	:	cm	ライブリバント (Day1)	350mg/body	
フリガナ	:	体重	:	kg	ライブリバント (Day8)	700mg/body	
患者氏名	:	体表面積	:	m <sup>2</sup>	ライブリバント (Day15,22)	1050mg/body	
		クレアチニン	:	mg/dL	ラズクルーズ	240mg/body	
生年月日	: S・H・R	年	月	日	薬剤師1次監査	年 月 日	
治療計画	外来初回治療日	年 月 日より	コース目	day 開始	①	薬剤師 2次監査	
				評価コース数		①	
外来担当医:	PHS	記載医師	:	PHS			
Rp		投与スケジュール: 1コース28日間	day1	day2	day8	day15	day22
1本目	インラインフィルターのついたルートを使用						
投与時間	末梢主管点滴注射		●	×	×	×	×
	デカドロン(6.6) 6.6mg						
	デカドロン(1.65) 3.3mg						
	ファモチジン(20) 20mg						
	ポララミン(5) 5mg						
	生食 100mL						
	15分						
2本目	末梢主管点滴注射		●	×	×	×	×
投与時間	アセリオ(100ml) 1000mg						
	15分						
3本目	末梢主管点滴注射	末梢側管点滴注射	●	×	×	×	×
投与時間	生食ヒカリ 500mL	ライブリバント__350__mg					
	12.5時間(40mL/hr)	生食全量 250mL					
	ライブリバント	開始後50mL/h					
	投与終了後残破棄	2時間後75mL/h					
		(__年__月__日__%doseへ減量)					
4本目		末梢側管点滴注射	●	×	×	×	×
投与時間		生食 50mL					
		全開					

1本目	インラインフィルターのついたルートを使用						
投与時間	末梢主管点滴注射		×	●	×	×	×
	デカドロン(6.6) 6.6mg						
	デカドロン(1.65) 3.3mg						
	ファモチジン(20) 20mg						
	ポララミン(5) 5mg						
	生食 100mL						
	15分						
2本目	末梢主管点滴注射		×	●	×	×	×
投与時間	アセリオ(100ml) 1000mg						
	15分						
3本目	末梢主管点滴注射	末梢側管点滴注射	×	●	×	×	×
投与時間	生食ヒカリ 500mL	ライブリバント__700__mg					
	12.5時間(40mL/hr)	生食全量 250mL					
	ライブリバント	開始後50mL/h					
	投与終了後残破棄	2時間後75mL/h					
		(__年__月__日__%doseへ減量)					
4本目		末梢側管点滴注射	×	●	×	×	×
投与時間		生食 50mL					
		全開					

内服処方	ラズクルーズ __240__ mg	28日間服用
	1日1回	

### 1. その他連絡事項

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

依頼する  依頼しない

# 外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科  
【80kg未満】アミバンタマブ+ラゼルチニブ療法【1コース目】

・コース終了後59-217Cへ移行

・アセリオについて体重が50kg未満は15mg/kgに減量

# 外来化学療法 投与計画書

# 呼吸器内科 【80kg未満】アミバンタマブ+ラゼルチニブ療法【1コース目】

59-220A

ライブリバント (Day1) 350mg/body  
ライブリバント (Day8) 700mg/body  
ライブリバント (Day15,22) 1050mg/body  
ラズクルーズ 240mg/body

ID	:	身長	:	cm					
フリガナ	:	体重	:	kg					
患者氏名	:	体表面積	:	m <sup>2</sup>					
	:	クレアチニン	:	mg/dL					
生年月日	: S・H・R		年	月	日	生まれ			
治療計画	外来初回治療日	年	月	日より	コース目	day	開始		
					予定コース数	評価コース数			
外来担当医:	PHS	記載医師	:	PHS	Ⓔ	薬剤師 2次監査	Ⓔ		
Rp	投与スケジュール: 1コース28日間			day1	day2	day8	day15	day22	
インラインフィルターのついたルートを使用									
1本目	末梢主管点滴注射	ファモチジン(20)	20mg		×	×	●	×	×
		ポララミン(5)	5mg						
		生食	100mL						
投与時間	15分								
2本目	末梢主管点滴注射	アセリオ(100ml)	1000mg		×	×	●	×	×
投与時間	15分								
3本目	末梢主管点滴注射	末梢側管点滴注射			×	×	●	×	×
	生食ヒカリ 500mL	ライブリバント_1050_mg							
		生食全量 250mL							
		12.5時間(40mL/hr)							
		ライブリバント							
投与時間	投与終了後残破棄								
4本目	末梢側管点滴注射	生食	50mL		×	×	●	×	×
投与時間	全開								

インラインフィルターのついたルートを使用									
1本目	末梢主管点滴注射	ファモチジン(20)	20mg		×	×	×	●	●
		ポララミン(5)	5mg						
		生食	100mL						
投与時間	15分								
2本目	末梢主管点滴注射	アセリオ(100ml)	1000mg		×	×	×	●	●
投与時間	15分								
3本目	末梢主管点滴注射	末梢側管点滴注射			×	×	×	●	●
	生食ヒカリ 500mL	ライブリバント_1050_mg							
		生食全量 250mL							
		12.5時間(40mL/hr)							
		ライブリバント							
投与時間	投与終了後残破棄								
4本目	末梢側管点滴注射	生食	50mL		×	×	×	●	●
投与時間	全開								

内服処方	ラズクルーズ	__240__ mg	28日間服用
	1日1回		

## 1. その他連絡事項

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

依頼する  依頼しない

・コース終了後59-220Bへ移行

・アセリオについて体重が50kg未満は15mg/kgに減量