

外来化学療法  
投与計画書

呼吸器外科  
ニボルマブ+CDDP+GEM療法(非小細胞癌)【ショートハイドレーション】

60-411

オブジーボ 360mg/body  
ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup>  
シスプラチン 75mg/m<sup>2</sup>

ID	:	身長	:	cm		
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面積	:	m <sup>2</sup>		
	:	クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日	:	S・H・R	年	月	日	生まれ
治療計画	外来初回治療日	年	月	日	より	コース目day
						開始
						予定コース数
						評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	:	PHS		
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		day1	day8	day15
内服	入室時アプレピタント125mg 1カプセル服用			●	×	×
	day2以降 アプレピタント80mg 1カプセル朝食後 2日分			day2-3	×	×
	デカドロン(0.5) 1日8mg 食後 2日分			day2-3		
	インラインフィルター(0.2~0.22μm)つきのルートを使用					
1本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	オブジーボ 360mg					
	生食 100mL					
投与時間	30分					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
2本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	生食 50mL					
投与時間	全開					
3本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL					
	L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL					
投与時間	1時間					
4本目	末梢主管点滴注射	末梢側管点滴注射		●	×	×
	生食 500mL	パロノセトロン(0.75) 0.75mg				
		デカドロン(6.6) 6.6mg				
		デカドロン(1.65) 3.3mg				
投与時間	30分	生食 100mL				
	(年 月 日 %doseへ減量)					
5本目	末梢側管点滴注射			●	×	×
	ゲムシタビン _____mg					
	生食 100mL					
投与時間	1時間					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
6本目	末梢主管点滴注射	末梢側管点滴注射		●	×	×
	フロセミド注(20) 20mg	生食 50mL				
投与時間	全開	生食 50mL				
	(年 月 日 %doseへ減量)					
7本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	シスプラチン _____mg					
	生食 250mL					
投与時間	2時間					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
8本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL					
	L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL					
投与時間	1時間					

1本目	末梢主管点滴注射			×	●	×
	デカドロン(6.6)	6.6mg				
	生食 100mL					
投与時間	30分					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
2本目	末梢主管点滴注射			×	●	×
	ゲムシタビン _____mg					
	生食 100mL					
投与時間	30分					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
3本目	末梢主管点滴注射			×	●	×
	生食 100mL					
投与時間	全開					

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)  
 依頼する  依頼しない

1. その他連絡事項

外来化学療法  
投与計画書

呼吸器外科  
ニボルマブ+CDDP+GEM療法(非小細胞癌)【ショートハイドレーション】