

外来化学療法
投与計画書

呼吸器外科
ニボルマブ+CDDP+ペメトレキセド療法(非小細胞肺癌)【ショートハイドレーション】

60-413

オブジーボ 360mg/body
ペメトレキセド 500mg/m²
シスプラチン 75mg/m²

ID	:	身長	:	cm
フリガナ	:	体重	:	kg
患者氏名	:	体表面积	:	m ²
	:	クレアチニン	:	mg/dL
生年月日	:	S・H・R	年 月 日	生まれ
治療計画	外来初回治療日	年 月 日より	コース目 day	開始
			予定コース数	評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	:	PHS
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間			day1 day8 day15
内服	入室時アプレピタント125mg 1カプセル服用			● × ×
	day2以降 アプレピタント80mg 1カプセル朝食後 2日分			day2-3 × ×
	デカドロン(0.5) 1日8mg 食後 2日分			day2-3 × ×
	インラインフィルター(0.2~0.22μm) つきのルートを使用			
1本目	末梢主管点滴注射			● × ×
	オブジーボ 360mg			
	生食 100mL			
投与時間	30分			
	(年 月 日 %doseへ減量)			
2本目	末梢主管点滴注射			● × ×
	生食 50mL			
投与時間	全開			
3本目	末梢主管点滴注射			● × ×
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL			
	L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL			
投与時間	生食 500mL			
	1時間			
4本目	末梢主管点滴注射	末梢側管点滴注射		● × ×
	生食 500mL	パロノセトロン(0.75) 0.75mg		
		デカドロン(6.6) 6.6mg		
		デカドロン(1.65) 3.3mg		
投与時間		生食 100mL		
		20分		
5本目	末梢側管点滴注射			● × ×
	ペメトレキセド mg			
	生食 100mL			
投与時間	10分			
	(年 月 日 %doseへ減量)			
6本目	末梢側管点滴注射			● × ×
	生食 50mL			
投与時間	1時間	全開		
7本目	末梢主管点滴注射			● × ×
	フロセミド注(20) 20mg			
	生食 50mL			
投与時間	全開			
8本目	末梢主管点滴注射			● × ×
	シスプラチン mg			
	生食 250mL			
投与時間	2時間			
	(年 月 日 %doseへ減量)			
9本目	末梢主管点滴注射			● × ×
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL			
	L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL			
投与時間	生食 500mL			
	1時間			

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
 依頼する 依頼しない

1. その他連絡事項

【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

*ビタミンB12 1mg【ex:メチコバル®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、

投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。

外来化学療法
投与計画書

呼吸器外科
ニボルマブ+CDDP+ペムトレキセド療法(非小細胞肺癌)【ショートハイドレーション】